




# Комплексний підхід до надання медичної допомоги хворим на деменцію

Кожина Г.М., Самойлова О.В., Шиліна Н.С.

Харківський національний медичний університет

У стійкості є координати



50°00'21" пн. ш.  
36°13'45" сх. д.



## Деменція


Стійке збіднення психічної діяльності з порушенням низки вищих коркових функцій

**Афективні розлади**  
(тривога, емоційна нестійкість, депресія)

**Поведінкові розлади**  
(втрата навичок спілкування, бродяжництво, розгальмування потягів)

**Продуктивні симптоми**  
(маячення і галюцинації)

Важка форма соціальної і побутової дезадаптації пацієнта





# Лікування деменції

Патогенетично  
обґрунтована  
медикаментозна терапія

Інгібітори  
холінестерази  
(ІХЕ)

Антагоніст рецептора  
N-метил-D-аспартату  
(NMDA) (Мемантин)

Психоосвіта,  
психологічна підтримка  
родин

Симптоматична терапія

Антидепресанти  
Нормотиміки  
Анксиолітики

Атипові  
антипсихотики

Психотерапія

Психосоціальна  
реабілітація



## Рекомендації FDA

### Базові препарати для лікування деменції Альцгеймерівського типу

Призначення	Застосування	Механізм дії	Найбільш поширені побічні ефекти
Мемантин	Помірна та тяжка ХА	Антагоніст NMDA-рецепторів	Запаморочення, головний біль, обстипація, сплутаність свідомості
Донепезил + мемантин	Помірна та тяжка ХА	iAXE + антагоніст NMDA-рецепторів	Нудота, блювання, діарея, запаморочення, головний біль.
Донепезил	Легка, помірна та тяжка ХА	iAXE	
Ривастигмін	Легка, помірна та тяжка ХА	iAXE	
Галантамін	Легка та помірна ХА	iAXE	



## Рекомендації NICE

**Хвороба Альцгеймера**

	Легка	Помірна	Тяжка
Пацієнти з уперше діагностованою хворобою Альцгеймера	Рекомендовано як засіб монотерапії Донепезил	Галантамін Ривастигмін	Рекомендовано як засіб монотерапії Мемантин
Пацієнти, які не переносять iAXE чи мають протипоказання до їх застосування		Рекомендовано як засіб монотерапії Мемантин	
Пацієнти, які приймають iAXE		Розглянути можливість додаткової терапії Мемантин	Запропонувати як засіб додаткової терапії Мемантин

Не припиняйте застосування iAXE лише через тяжкість ознак хвороби

Примітка. iAXE – інгібітори ацетилхолінестерази.



## Психотерапевтичний комплекс для хворих на деменцію

**Деменція  
Легкого  
ступеня**

**Програма  
когнітивної  
стимуляції**

**Психоосвітня програма  
для хворих на деменцію**

**Когнітивно-стимулююча терапія**

**Групова психотерапія спогадів**

**Психоосвітня програма для  
родичів хворих на деменцію**

**Деменція  
Помірного та  
важкого ступеня**

**Тренінг соціально-  
побутових навичок**

**Стимулювальна  
терапія**

**Ерготерапія**