



Клініко-психопатологічні особливості емоційних та когнітивних розладів у хворих на цукровий діабет


Phd Кондратенко А.П.

Харківський національний медичний університет





109 хворих на цукровий діабет II типу середнього та важкого ступеня важкості




Основна група


65 хворих які, крім стандартного лікування за клінічними протоколами, проходили розроблену психотерапевтичну програму

Контрольна група

44 пацієнти, які отримували стандартну терапію за клінічними протоколами



Виразність тривожності за шкалою Спілбергера-Ханіна (%)



Рівні тривоги та депресії в обстежених хворих за шкалою Гамільтона (%)



Показники за шкалою MMSE (бали)

	Чоловіки	Жінки
Загальний показник	25,2 ± 0,2	25,8 ± 0,2
Обсяг вербальної пам'яті	4,7 ± 0,8	4,5 ± 0,5
Швидкість лічильних операцій	3,6 ± 0,8	3,8 ± 0,8
Здатність до орієнтації	8,1 ± 0,6	8,0 ± 0,6
Показники перцептивно-гностичної сфери	8,6 ± 0,5	8,8 ± 0,5

Показники проби на запам'ятовування 10 слів (бали)

	Чоловіки	Жінки
Короткотривала пам'ять	8,7 ± 0,6	8,5 ± 0,5
Довготривала пам'ять	7,8 ± 0,7	7,9 ± 0,7
Кількість помилок	2,4 ± 0,4	2,8 ± 0,5

Особливості особистості обстежених хворих

