




КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕС-АСОЦІЙОВАНИХ РОЗЛАДІВ У ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ.

Зеленська К.О., Самойлова О.В., Литвиненко В.В.
Харківський національний медичний університет





105 внутрішньо
переміщених осіб



Стресасоційовані розлади в умовах повномасштабного втручання

Депресивний синдромокомплекс

- ✓ Реактивна депресія на втрати
- ✓ Ускладнена горем депресія
- ✓ Змішані стани: поєднання депресії з тривожністю та ПТСР
- ✓ Підвищений суїцидальний ризик
- ✓ Соціальна ангедонія
- ✓ Складність діагностики: нормальні реакції vs патологічні стани
- ✓ Резистентність до лікування: постійний вплив стресових чинників

«Тунельне мислення»
песимістичні думки про майбутнє,
неможливість уявити альтернативу
в розвитку подій

Саморетравматизація


Неможливість концентруватися
на ресурсах «тут і зараз»

Хронічний більовий синдром

Тривожний синдромокомплекс

- ✓ Надмірна турбота про безпеку в ситуаціях, що цього не потребують
- ✓ Радарне сканування - постійний пошук загроз
- ✓ Акустична гіперчутливість — реакція на кожен звук
- ✓ Скролінг - залежність від додатків сповіщення, нав'язливе оновлення новин
- ✓ Гіперфокусованість - надмірна увага до звуків, новин, зміни обстановки.
- ✓ Втрата периферійного сприйняття

Ступень виразності травматичного стресу (%)



Рівні соціальної фрустрованості (%)

