



# ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДИСОЦІАТИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ ТА СУЇЦИДАЛЬНОГО РИЗИКУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ПТСР

Герасименко Л.О., Золочевський І.О.

Полтавський державний медичний університет, м.  
Полтава, Україна

Комунальне підприємство «Обласний заклад з  
надання психіатричної допомоги Полтавської обласної  
ради»

## **АКТУАЛЬНІСТЬ:**

- ▶ ПТСР є одним із найбільш поширених психічних розладів серед учасників бойових дій.
- ▶ Дисоціативні прояви можуть асоціюватися з тяжчим перебігом ПТСР.
- ▶ Суїцидальний ризик у військовослужбовців залишається важливою медико-соціальною проблемою.

## **МЕТА:**

Дослідити взаємозв'язок між вираженістю дисоціативної симптоматики та рівнем суїцидального ризику у військовослужбовців із ПТСР.

# Матеріали та методи

## Учасники:

- 32 військовослужбовці з ПТСР (F43.1)
- стать чоловіча,  $31 \pm 5$  років
- учасники бойових дій

## Методи:

- ✓ PCL-5 — оцінка симптомів ПТСР
- ✓ DES-II — дисоціативна симптоматика
- ✓ BSS/BSI — суїцидальні ідеї
- ✓ Статистичну обробку результатів проводили із використанням Microsoft Excel із застосуванням методів описової статистики та кореляційного аналізу.

# Результати

## Дисоціативна симптоматика :

- виявлена у **53,1%** обстежених
- клінічно значущий рівень — у **31,3%**

## Суїцидальний ризик:

- суїцидальні думки — **40,6%**
- високий ризик — **25,0%**

## Кореляційний аналіз:

- DES-II ↔ суїцидальні ідеї;

$r = 0,52; p < 0,05$

- тяжкість ПТСР ↔ суїцидальний ризик;

$r = 0,58; p < 0,05$

## ОБГОВОРЕННЯ

- ❖ Отримані результати свідчать про важливу роль дисоціативної симптоматики у формуванні суїцидального ризику при ПТСР.
- ❖ Дисоціативні прояви можуть маскувати емоційний дистрес та ускладнювати своєчасне виявлення суїцидальних тенденцій.
- ❖ Виявлені особливості доцільно враховувати під час психодіагностики та психореабілітації військовослужбовців.

## ВИСНОВКИ

- I. Встановлено позитивний зв'язок між дисоціативною симптоматикою та суїцидальним ризиком.
- II. Дисоціація може виступати клінічним предиктором суїцидальних тенденцій.
- III. Скринінг дисоціативних проявів є важливим компонентом психіатричної допомоги.